

Příbalová informace: informace pro uživatele
Robicold Rapid 200 mg/30 mg měkké tobolky
ibuprofenum /pseudoefedrinu hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek Robicold Rapid užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Přípravek Robicold Rapid je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy užívejte přípravek Robicold Rapid přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Robicold Rapid a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robicold Rapid užívat
3. Jak se přípravek Robicold Rapid užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Robicold Rapid uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Robicold Rapid a k čemu se používá

Co je přípravek Robicold Rapid

Přípravek Robicold Rapid obsahuje dvě léčivé látky: ibuprofen a pseudoefedrin.

- Ibuprofen patří do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní antiflogistika (NSAID). Pomáhá mírnit bolest a snižovat vysokou teplotu (horečku).
- Pseudoefedrin patří do skupiny léčiv nazývaných vazokonstriktory. Pomáhá zprůchodnit nos a zmírňuje zduření nosní sliznice.

K čemu se přípravek Robicold Rapid používá

Přípravek Robicold Rapid se u dospělých a dospívajících od 12 let používá k léčbě příznaků běžného nachlazení a chřipky, včetně bolesti hlavy, vysoké teploty (horečky), bolesti v krku, dalších bolestí a ucpaného nosu.

Tento přípravek používejte pouze tehdy, máte-li ucpaný nos a společně s tím i další příznaky uvedené výše (jako bolest hlavy či vysokou teplotu). Přípravek neužívejte, pokud se u Vás vyskytuje pouze jeden z výše uvedených příznaků.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robicold Rapid užívat

Neužívejte přípravek Robicold Rapid, jestliže:

- jste alergický(á) na ibuprofen nebo pseudoefedrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6 nebo jestliže se u Vás v minulosti objevila alergická reakce na podobné léčivo, např. kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná NSAID. Mezi projevy alergické reakce patří kožní vyrážka, kopřivka, svědění, ztížené dýchání, tíha na hrudi, otok úst, obličeje, rtů nebo jazyka.

- jste v minulosti po užití přípravku Robicold Rapid, ibuprofenu, kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID měl(a) poruchy trávicího traktu, např. se objevily žaludeční vředy, krvácení do žaludku nebo perforace (proděravění).
- v současnosti máte žaludeční vřed nebo krvácení do žaludku nebo se u Vás objevily jiné známky krvácení.
- máte závažné problémy s játry nebo ledvinami.
- jste těhotná nebo kojíte.
- jste mladší 12 let.
- máte závažné problémy se srdcem, mezi které patří:
 - závažné srdeční selhání,
 - vysoký krevní tlak,
 - závažné srdeční onemocnění,
 - angina pectoris (bolest na hrudi).
- jste někdy prodělal(a) cévní mozkovou příhodu (mrtvici).
- v současnosti užíváte:
 - další léčivé přípravky obsahující NSAID určené k úlevě od bolesti, jako je ibuprofen nebo kyselina acetylsalicylová,
 - další léčivé přípravky určené k zprůchodnění nosu podávané perorálně (ústy) nebo nazálně (nosem), jako je pseudoefedrin, fenylpropanolamin, fenylefrin nebo efedrin,
 - přípravky k léčbě deprese nazývané neselektivní inhibitory monoaminoxidázy (IMAO), jako je iproniazid, nebo pokud jste je užili v posledních 14 dnech,
 - jiné přípravky k léčbě deprese nazývané tricyklická antidepresiva, jako je amitriptylin.
- trpíte diabetem nebo máte problémy se štítnou žlázou nebo nádor nadledviny (nazývaný feochromocytom).
- máte glaukom (zvýšený nitrooční tlak).
- máte potíže s močením způsobené problémy s prostatou nebo jinými příčinami.

Pokud se u Vás vyskytuje některý z výše uvedených stavů, přípravek Robicold Rapid neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat přípravek Robicold Rapid.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Robicold Rapid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

- máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělal(a) srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“).
- máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.
- máte astma; v takovém případě u Vás totiž může hrozit astmatický záchvat.
- máte problémy s játry nebo s ledvinami.
- máte problémy s prostatou.
- máte problémy s krvácením.
- jste v minulosti měl(a) poruchy trávicího traktu, jako jsou žaludeční vředy, krvácení do žaludku, ulcerózní kolitida nebo Crohnova nemoc.
- máte systémový lupus erythematosus (SLE), což je onemocnění postihující imunitní systém a způsobující bolest kloubů, kožní změny a další problémy.

Pseudoefedrin může při testech na doping vyvolat pozitivní výsledky. Pokud by se Vás mohly tyto testy týkat, přípravek Robicold Rapid neužívejte.

Pokud se objeví rozsáhlé zarudnutí kůže s výskytem neštoviček (pustul) doprovázené horečnatým stavem, přestaňte přípravek Robicold Rapid užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Viz bod 4.

Pokud máte kterýkoli z výše uvedených stavů nebo si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat přípravek Robicold Rapid.

Srdeční záchvat a mozková příhoda

Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Starší osoby

Pokud jste starší osoba a užíváte Robicold Rapid, existuje u Vás vyšší riziko výskytu nežádoucích účinků, jako je krvácení do žaludku nebo proděravění žaludku (mezi známky může patřit bolest žaludku a pálení žáhy). Toto Vás může ohrozit na životě. Více informací najdete v bodě 4 „Nežádoucí účinky“.

Děti a dospívající

Nedávejte přípravek Robicold Rapid dětem mladším 12 let.

Pokud je Vám mezi 12 a 17 lety a nevpil(a) jste dostatek tekutin nebo jste dehydrovaný(á) z důvodu průjmu nebo zvracení, poraďte se před užíváním přípravku Robicold Rapid se svým lékařem nebo lékárníkem. U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.

Další léčivé přípravky a přípravek Robicold Rapid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto se vztahuje také na léky, které jste získal(a) bez předpisu, a na bylinné léčivé přípravky.

Neužívejte přípravek Robicold Rapid, jestliže užíváte některé z následujících léků:

- další léčivé přípravky obsahující NSAID včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2 určených k úlevě od bolesti, jako je ibuprofen nebo kyselina acetylsalicylová,
- další léčivé přípravky určené ke zprůchodnění nosu podávané perorálně (ústí) nebo nazálně (nosem), jako je pseudoefedrin, fenylpropanolamin, fenylefrin nebo efedrin,
- přípravky k léčbě deprese nazývané neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO), jako je iproniazid, nebo pokud jste je užili v posledních 14 dnech,
- jiné přípravky k léčbě deprese nazývané tricyklická antidepresiva, jako je amitriptylin.

Pokud pro Vás platí výše uvedené, přípravek Robicold Rapid neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat přípravek Robicold Rapid.

Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Robicold Rapid, jestliže užíváte některé z následujících léků:

- léky proti depresi nazývané reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy A (RIMA) a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je fluoxetin,
- linezolid,
- bromokriptin, pergolid, lisurid, kabergolin, ergotamin nebo dihydroergotamin,
- antikoagulantia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin),
- heparin, pokud se používá k léčbě nebo prevenci vzniku krevní sraženiny,
- lithium, pokud se používá k léčbě závažných problémů se změnami nálady,
- methotrexát,

- léky snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan) nebo jakékoli tablety na odvodnění (diuretika),
- digoxin nebo chinidin používané k léčbě problémů se srdcem,
- cyklosporin nebo takrolimus užívané po transplantačním zákroku,
- draslík šetřící diuretika, jako je amilorid nebo spironolakton,
- fenytoin používaný k léčbě epilepsie,
- probenecid a sulfínyprazon používané k léčbě dny,
- zidovudin používaný k léčbě HIV,
- deriváty sulfonylurey, jako je gliklazid nebo glimepirid, používané k léčbě diabetu,
- chinolonová antibiotika, jako je ciprofloxacin,
- ginkgo biloba,
- antacida,
- mifepriston používaný k ukončení těhotenství,
- kortikosteroidy (typ protizánětlivých léčiv), jako je hydrokortizon,
- aminoglykosidy, jako je gentamicin nebo amikacin,
- furazolidon, antibakteriální léčivo,
- guanetidin, reserpin nebo methyldopa.

Pokud, užíváte přípravek Robicold Rapid a potřebujete anestezii před operací, informujte o tom svého lékaře. Váš lékař Vás požádá o ukončení užívání přípravku Robicold Rapid několik dní před anestezii. Můžete také informovat svého anesteziologa (lékař, který Vám anestezii podává) o tom, že jste přípravek Robicold Rapid užíval(a).

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Robicold Rapid. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Robicold Rapid užívat s jinými léčivými přípravky.

Přípravek Robicold Rapid s alkoholem

Během užívání přípravku Robicold Rapid nepijte alkohol.

Těhotenství a kojení

- Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte přípravek Robicold Rapid.
- Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Plodnost

Ibuprofen může mít nepříznivý vliv na schopnost ženy otěhotnět. Tento účinek ustane, jakmile se léčba ibuprofenem ukončí.

Není pravděpodobné, že by občasné užívání ibuprofenu mohlo ovlivnit Vaše šance na otěhotnění. Pokud jste v minulosti měla problém s otěhotněním, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Robicold Rapid můžete mít pocit závratě, nezvyklé bolesti hlavy nebo problémy se zrakem nebo sluchem, můžete i vidět a slyšet věci, které nejsou skutečné (halucinace). Pokud se u Vás takové účinky projeví, neřídte vozidla, nejezděte na kole, nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Robicold Rapid obsahuje sorbitol (E 420), sójový lecitin a draslík

Přípravek Robicold Rapid obsahuje sorbitol (E 420), (druh cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte nebo nedokážete trávit některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Robicold Rapid obsahuje sójový lecitin. Pokud jste alergický(á) na arašídny nebo sóju, nesmíte tento přípravek užívat.

Přípravek Robicold Rapid obsahuje v jedné tobolce 0,41 mmol draslíku. Je nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin a u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku.

3. Jak se přípravek Robicold Rapid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající od 12 let:

Jaké množství se užívá

- Doporučená dávka je 1 tobolka každých 4 až 6 hodin.
- V případě závažnějších příznaků můžete užít 2 tobolky najednou.
- Neužívejte více než 6 tobolek během 24 hodin.

Užívání tohoto přípravku

Polykejte tobolky v celku a zapijte je velkou sklenicí vody.

Jak dlouho se tento přípravek má užívat

Tento přípravek neužívejte déle než 5 dnů.

- Tento přípravek je určený pouze ke krátkodobému užívání. K léčbě příznaků onemocnění užívejte nejnižší možnou dávku po co nejkratší dobu.
- Pokud se nebudete cítit lépe, přitíží se Vám nebo se u Vás objeví jakékoli nové příznaky, musíte se poradit s lékařem. Lékař Vám řekne, zda je bezpečné pokračovat v užívání tohoto přípravku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Robicold Rapid, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Robicold Rapid než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu. Vezměte s sebou obal od tohoto přípravku.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po užití vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.

Pokud omylem užijete více přípravku Robicold Rapid než jste měl(a) (předávkování), přestaňte přípravek užívat.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Robicold Rapid

- Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Robicold Rapid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Riziko výskytu nežádoucích účinků můžete snížit, pokud budete užívat nejnižší možnou dávku přípravku po co nejkratší dobu potřebnou k léčbě Vašich příznaků.

U tohoto přípravku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Přestaňte ihned užívat přípravek Robicold Rapid a informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

- pocit na zvracení (nevolnost),
- krvácení do žaludku nebo do střeva, mezi známky patří zvracení krve, krev ve stolici nebo černě zbarvená stolice.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

- silné bolesti hlavy nebo bolesti hlavy, které jsou silnější než obvykle.

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

- srdeční záchvat,
- zrychlený tep nebo palpitace,
- alergická reakce na přípravek Robicold Rapid; mezi projevy patří kožní vyrážka, kopřivka, svědění, ztížené dýchání, tíha na hrudi, otok úst, obličeje, rtů nebo jazyka,
- puchýřnaté léze na kůži nebo sliznicích, např. v ústech; mezi jejich známky patří pocit pálení, zrudnutí, tvorba puchýřů a vředů.

Není známo: není známo, jak často se tyto nežádoucí účinky vyskytují

- cévní mozková příhoda
- problémy v chování, jako jsou pocity rozrušenosti, agitovanosti, úzkosti, neklidu nebo nervozity
- během prvních dvou dnů léčby přípravkem Robicold Rapid může dojít k náhlému nástupu horečky, zarudnutí kůže nebo vzniku četných malých neštoviček (možné příznaky akutní generalizované exantematózní pustulózy – AGEP). Viz bod 2. Pokud se u vás tyto příznaky projeví, přestaňte Robicold Rapid užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Přestaňte ihned užívat přípravek Robicold Rapid a informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže zaznamenáte některý z nežádoucích účinků uvedených výše.

Další nežádoucí účinky

Informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

- porucha trávení, bolest žaludku, nevolnost (zvracení), průjem, zácpa, větry.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

- žaludeční vřed,
- nespavost,
- pocit ospalosti nebo únavy,
- pocit závratě nebo podráždění,
- problémy se zrakem,
- neutuchající bolesti hlavy,
- kožní projevy, jako je vyrážka nebo svědění,
- zánět žaludku nebo střev, zhoršení již přítomného zánětlivého střevního onemocnění,
- hypersenzitivita projevující se např. jako pískání nebo ztížené dýchání u pacientů, kteří v minulosti trpěli průduškovým astmatem nebo alergickým onemocněním.

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů

- problémy s ledvinami,
- zvonění v uších (tinnitus).

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

- deprese,
- selhání srdce,
- selhání ledvin,
- vysoký krevní tlak,
- bolestivá nebo zanícená ústa,
- zánět slinivky (pankreatitida),
- zúžení střeva (střevní striktura),
- aseptická meningitida (neinfekční zánět mozkových blan), zhoršení infekčních zánětů,
- problémy s krvinkami – mohou u Vás snadněji vznikat modřiny nebo infekce,

- problémy s játry, včetně abnormálních jaterních funkcí, hepatitidy nebo ikteru (zežloutnutí kůže nebo očí).

Není známo: není známo, jak často se tyto nežádoucí účinky vyskytují

- bolest na hrudi,
- sucho v ústech, pocit žízně,
- abnormální svalové křeče, záchvaty,
- pocit otáčení (vertigo),
- snížená hladina hematokritu a snížený hemoglobin (krevní barvivo),
- vidíte nebo slyšíte věci, které nejsou skutečné (halucinace),
- kožní vyrážka, červené nebo fialové zabarvení kůže, zadržování tekutiny (edém),
- méně časté močení, krev nebo bílkoviny v moči (prokáže se při testu)
- může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek).

Informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže se u Vás objeví některý z nežádoucích účinků uvedených výše.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Robicold Rapid uchovávat

- Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
- Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a balení blistru za „Použijte do:“ a „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
- Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
- Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Robicold Rapid obsahuje

- Léčivými látkami jsou ibuprofenum 200 mg a pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg.
- Dalšími složkami jsou:
 - Tekutá náplň: roztok hydroxidu draselného (46 – 48%), makrogol 600, čištěná voda.
 - Želatinová tobolka: sorbitol (E 420), želatina, černý potiskovací inkoust [makrogol 400, polyvinyl-acetát-ftalát, propylenglykol, černý oxid železitý (E172)].
 - Pomocné látky: sójový lecithin ve středních nasycených triacylglycerolech.

Jak přípravek Robicold Rapid vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Robicold Rapid je průhledná, oválná, měkká tobolka. Je potíštěna černým inkoustem logem 200/30.

Přípravek Robicold Rapid dostanete od svého lékárníka balený v blistrech z bílé, neprůhledné PVC/PVdC nebo PVC/PE/PVdC fólie tepelně uzavřených pergamen/Al fólií, které obsahují 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20 nebo 24 tobolek. Blistry jsou vloženy do papírové krabičky. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Corporation Austria GmbH
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko

Výrobce

Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.
Via Nettunense 90
04011 Aprilia (Latina)
Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Velká Británie: RobiCold Cold & Flu Relief 200mg/30mg Soft Capsules

Irsko: Advil Sinus Relief Soft Capsules
Ibuprofen 200 mg / Pseudoephedrine 30 mg

Rumunsko: Robicold Sinus & Raceala 200 mg/30 mg capsule moi

Slovensko: Robicold Rapid 200mg/30mg mäkké kapsuly

Malta: Advil Sinus Relief Soft Capsules
Ibuprofen 200 mg / Pseudoephedrine 30 mg

Česká republika: Robicold Rapid

Maďarsko: Advil Cold Rapid 200 mg/30 mg lágy kapszula

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 7. 2018